

University of Groningen

Chronische pyodermieën

Ruiter, Maximiliaan

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1932

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Ruiter, M. (1932). *Chronische pyodermieën*. Ruiter, Maximiliaann.

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

HOOFDSTUK V.

Samenvatting.

In het eerste hoofdstuk werd een inleiding tot de pyodermieën in het algemeen gegeven, waarbij het vraagstuk van de indeeling dezer aandoeningen meer uitvoerig behandeld werd. Het tweede hoofdstuk was gewijd aan de belangrijkste literatuur, welke in het bijzonder over de chronische pyodermieën bestaat. Naar aanleiding van de verschillende vormen, die hier werden besproken, werd bovenal de aandacht op de als pyodermia chronica papillaris et exulcerans bekend staande variëteit gevestigd. Aan de hand van verscheiden gevallen werd betoogd, dat deze vorm, door zijn klinische en deels ook door zijn histologische eigenschappen, op een afzonderlijke plaats onder de chronische pyodermieën aanspraak maakt. Tevens werd opgemerkt, dat verschillende onder andere benamingen gepubliceerde gevallen tot deze variëteit dienen te worden gerekend. Gezien de groote verwarring, welke in de nomenclatuur der chronische pyodermieën bestaat, werd de wenschelijkheid geuit om dergelijke gevallen in het vervolg als pyodermia chronica papillaris et exulcerans te publiceeren, daar deze benaming de meest karakteristieke eigenschappen dezer aandoeningen weergeeft.

Het derde hoofdstuk bevatte een samenvattend en zooveel mogelijk critisch overzicht over de aetiologie, de histologie en de therapie der chronische pyodermieën.

Conclusies betreffende de geobserveerde gevallen.

De bevindingen, welke bij het onderzoek en de observatie der verschillende patiënten aan den dag traden, zijn slechts ten deele in een samenvattend overzicht te verwerken. De reden hiervoor is, dat bijna alle gevallen van pyodermia chronica papillaris et exulcerans, welke ik onder oogen kreeg, meer of minder belangrijke klinische verschillen vertoonden. Ook week het klinische beeld van een er van (geval 3) dusdanig van het gebruikelijke af, dat dit geval wel als een bijzonderen vorm van deze aandoening kan worden beschouwd (verru-